

Sofortiges Einsetzen des Implantats

Eine schnellere und komfortablere Methode, Ihr Lächeln wiederherzustellen, im Vergleich zur herkömmlichen Implantatbehandlung¹.



Was versteht man unter dem sofortigen Einsetzen des Implantats?

Wenn ein beschädigter Zahn durch ein Zahnimplantat ersetzt werden muss, ermöglicht das sofortige Einsetzen des Implantats Ihrem Zahnarzt, den beschädigten Zahn zu entfernen und das Zahnimplantat noch beim selben Termin einzusetzen.

Was ist die Sofortbelastung?

Dies wird auch als „sofortige Belastung“ bezeichnet und bedeutet, dass innerhalb von 48 Stunden² eine provisorische Krone oder Brücke auf das Zahnimplantat gesetzt wird.

Warum Patienten diesen Ansatz schätzen

(im Vergleich zur herkömmlichen Implantatbehandlung*)



Schnellere Behandlung, weniger Termine

Man muss nicht monatelang zwischen den Behandlungen warten. Noch am selben Tag können Sie von einem alten Zahn zu einem neuen Lächeln gelangen.



Weniger Schmerzen, weniger Stress¹

Weniger Eingriffe bedeuten weniger körperliche Schädigungen, weniger Betäubung und mehr Komfort.



Geringere Gesamtkosten

Durch die Kombination verschiedener Verfahren und den Verzicht auf Knochentransplantate oder provisorischen Zahnersatz können Sie möglicherweise die Gesamtkosten der Behandlung senken.

* Im Sinne dieser Broschüre umfasst die traditionelle Implantatbehandlung sowohl frühzeitige als auch verzögerte Behandlungsprotokolle.

1 Gallucci GO, Hamilton A, Zhou W, Buser D, Chen S. Implant placement and loading protocols in partially edentulous patients: A systematic review. Clin Oral Impl Res. 2018;29(S16):106-134.

2 Cochran DL, Morton D, Weber HP. Consensus statements and recommended clinical procedures regarding loading protocols for endosseous dental implants. Int J Oral Maxillofac Implants 2004;19(suppl):109-113.

3 Mura P. Immediate Loading of Tapered Implants Placed in Postextraction Sockets: Retrospective Analysis of the 5-Year Clinical Outcome. Clin Implant Dent Relat Res 2012;14:565-74. / Degidi M, Nardi D, Piattelli A. 10-Year Follow-Up of Immediately Loaded Implants with TiUnite Porous Anodized Surface. Clin Implant Dent Relat Res 2012. / Polizzi G, Cantoni T. Five-Year Follow-Up of Immediate Fixed Restorations of Maxillary Implants Inserted in Both Fresh Extraction and Healed Sites Using the NobelGuide™ System. Clin Implant Dent Relat Res 2013.



Schützt Knochen und Zahnfleisch

Das sofortige Einsetzen des Implantats bzw. der Implantate beugt Knochenverlust vor und erhält die Zahnfleischform, was für die langfristige Ästhetik von entscheidender Bedeutung ist.



Hohe Erfolgsrate³

Studien zeigen, dass Implantate, die sofort eingesetzt und noch am selben Tag mit einer Prothese versorgt werden, unter den richtigen Bedingungen eine Erfolgsquote von 97–100 % aufweisen.



Lang anhaltende Ergebnisse

Bei richtiger Pflege kann Ihr Implantat ein Leben lang halten – genau wie bei einer herkömmlichen Implantatbehandlung.

Wichtig: Ihr Zahnarzt ist nach wie vor Ihre beste Anlaufstelle für Informationen zu Ihrer Zahnpflege und Ihren Behandlungsmöglichkeiten. Er/Sie kann Ihnen weitere Informationen geben und Ihre Fragen beantworten bzw. auf Ihre Bedenken eingehen.

**Nicht jeder kommt dafür
in Frage – aber wenn Sie
bei guter Gesundheit sind
und über ausreichend
Knochenmasse verfügen,
könnte dies der schnellste und
angenehmste Weg sein, Ihr
Lächeln wiederherzustellen.**

**Sprechen Sie noch heute mit Ihrem
Zahnarzt, um herauszufinden, ob ein
sofortiges Einsetzen des Implantats die
richtige Wahl für Ihr Lächeln ist!**

Praxisstempel

96719 DE 2606 Gedruckt in der EU © Nobel Biocare Services AG, 2026.

Alle Rechte vorbehalten. Die Produktabbildungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts. Dieses Material dient nur zu Informationszwecken. Es ersetzt nicht den Rat oder die Beratung durch eine medizinische Fachkraft. Nobel Biocare ist bestrebt, korrekte und aktuelle Informationen bereitzustellen, übernimmt jedoch diesbezüglich keine Gewähr. Sie sollten sich mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin beraten und sich ausschließlich auf dessen bzw. deren Rat verlassen.

Die Behandlung mit Zahnimplantaten ist ein chirurgisches Verfahren, das mit bestimmten Risiken einhergeht, und erfordert die vorherige Beurteilung durch Ihren Zahnarzt, um sicherzustellen, dass Ihre Zahngesundheit und allgemeine Gesundheit eine Behandlung mit Zahnimplantaten zulassen.

Zahnimplantate sind nicht vorgesehen für pädiatrische Patienten, deren Kieferknochenwachstum nicht nachweisbar abgeschlossen ist, bzw. für Personen, bei denen die gesundheitlichen Voraussetzungen für einen zahnchirurgischen Eingriff nicht erfüllt werden/eine Allergie oder Überempfindlichkeit gegen handelsübliches Reintitan besteht/oder die nicht über ausreichendes Knochenvolumen verfügen. Nach dem Einsetzen heilen Dentalimplantate ggf. nicht in den Knochen ein. Wenn dies passiert, müssen sie in einem zweiten Eingriff entfernt werden. Bestimmte Faktoren können den Heilungsprozess von Knochen oder Weichgewebe beeinträchtigen. Diese sind: Rauchen/unbehandelter Diabetes/orofaziale Strahlentherapie/Steroidbehandlung/Infektionen des angrenzenden Knochens. Ob die Versorgung sofort eingesetzt werden kann und ob die prothetische Versorgung sofort funktionsfähig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Knochenquantität und -qualität, vorherigen Befunden und Behandlungen, Implantatposition und Verfügbarkeit der endgültigen Versorgung.

Ihre Zahnärztin/Ihr Zahnarzt wird Ihnen vor dem Eingriff in einem Beratungsgespräch die möglichen Szenarien beschreiben. Sprechen Sie mit Ihrer Zahnärztin/Ihrem Zahnarzt, um herauszufinden, ob Dentalimplantate das Richtige für Sie sind.

In einigen Märkten sind eine direkt an den Patienten gerichtete Kommunikation sowie ärztliche Werbung u. U. streng verboten. Der Behandler ist verpflichtet, sich über mögliche gesetzliche Beschränkungen zu informieren und die Gesetze und Vorschriften des jeweiligen Landes einzuhalten.

